

Порядок маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию определённых групп взрослого населения



Порядок маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию определённых групп взрослого населения

Второй этап диспансеризации

<p>дуплексное сканирование брахицефальных артерий</p>	<p>(в случае наличия указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования, а также для мужчин в возрасте от 45 лет и старше и женщин в возрасте старше 55 лет при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, дислипидемия, избыточная масса тела или ожирение);</p>
<p>эзофагогастродуоденоскопию</p>	<p>(при выявлении по результатам анкетирования жалоб, свидетельствующих о возможном онкологическом заболевании верхних отделов желудочно-кишечного тракта или для граждан в возрасте старше 50 лет при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта);</p>
<p>осмотр (консультацию) врачом-неврологом</p>	<p>(в случае указания или подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения по результатам анкетирования у граждан, не находящихся под диспансерным наблюдением по данному поводу, а также в случаях первичного выявления нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрения на депрессию у граждан в возрасте 75 лет и старше);</p>
<p>осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом</p>	<p>(для мужчин в возрасте от 42 до 69 лет при впервые выявленных по результатам анкетирования признаках патологии мочеполовой системы или при отягощенной наследственности по онкологическим заболеваниям предстательной железы, а также для мужчин вне зависимости от возраста в случае подозрения на онкологическое заболевание предстательной железы по результатам УЗИ);</p>

Порядок маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию определённых групп взрослого населения

Второй этап диспансеризации

осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом	(для граждан при положительном анализе кала на скрытую кровь, для граждан в возрасте 45 лет и старше при отягощенной наследственности по семейному полипозу, онкологическим заболеваниям колоректальной области, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов онкологических заболеваний колоректальной области);
колоноскопию или ректороманоскопию	(в случае подозрения на онкологическое заболевание толстой кишки по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога);
определение липидного спектра крови	(уровень общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности, холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицеридов) (для граждан с выявленным повышением уровня общего холестерина в крови);
спирометрию	(для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание по результатам анкетирования, курящих и по направлению врача-терапевта);
осмотр (консультацию) врачом-акушером-гинекологом	(для женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам цитологического исследования мазка с шейки матки и (или) маммографии, УЗИ матки и яичников);
определение концентрации гликированного гемоглобина в крови или тест на толерантность к глюкозе	(для граждан с выявленным повышением уровня глюкозы в крови);
осмотр (консультацию) врачом-оториноларингологом	(для граждан в возрасте 75 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или осмотра врача-терапевта);

Порядок маршрутизации пациентов, проходящих диспансеризацию определённых групп взрослого населения

Второй этап диспансеризации

<p>анализ крови на уровень содержания простатспецифического антигена</p>	<p>(по назначению врача-хирурга или врача-уролога мужчинам с подозрением на онкологическое заболевание предстательной железы по результатам опроса, осмотра, пальцевого исследования или УЗИ предстательной железы);</p>
<p>осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом</p>	<p>для граждан в возрасте 39 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 75 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования);</p>
<p>индивидуальное углубленное профилактическое консультирование</p>	<p>или групповое профилактическое консультирование (школа пациента) в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья, фельдшерском здравпункте или фельдшерско-акушерском пункте) (для граждан с выявленными факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, имеющих указанные заболевания или имеющих высокий и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск);</p>
<p>прием (осмотр) врача-терапевта</p>	<p>включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы состояния здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение.</p>